


ELANCO ARTWORK LEGEND	
Change Control No.:	086051A
Item Code / Proof No.:	086051A_YL086051SPX_P1a
Previous Item Code:	BG7621IDESPL
Product Code:	AF0460
Product Name:	Apralan 100
Country:	Spain
Component:	Bag Label
Text Approval Code:	V03-04-2012
Pack Size:	25kg
Packaging Specification(s):	Base Specification: GPG180 Primary Specification: BG6550
Template:	LA_300x600mm_Provimi_V2
Barcode(s) & Type(s):	EAN 13 5014602844035
Additional information:	N/A
Originated by & date:	SG 11-May-2012
P..... amended by & date:	N/A
Printed from the Approved Electronic Version	
ELMS Studio Signature:	
Date:	
	
<small>WARNING: THIS MATERIAL IS COPYRIGHT AND PROPRIETY TO: Eli Lilly and Company Limited</small> <small>UNAUTHORISED POSSESSION, USE OR REPRODUCTION WILL ATTRACT CRIMINAL PENALTIES AND LIABILITY FOR DAMAGES AND LEGAL COSTS.</small> <small>Process colour reproduction may not match PANTONE identified solid colour standards. Refer to current PANTONE Colour Publications for the accurate colour.</small>	
BLACK	PMS 381 C
	NON PRINTING

TEMPLATE LEGEND

Template name:	LA_300x600mm_Provimi_v2
Created/Revised by:	Steve Gannon
Created/Revised on:	27-May-2011
Print vendor:	Riverside
Approved by:	Mike Ashley
Date approved:	27-May-2011


**WARNING: THIS MATERIAL IS COPYRIGHT AND PROPRIETY TO:
Eli Lilly and Company Limited,
Speke Operations**
UNAUTHORISED POSSESSION, USE OR REPRODUCTION WILL ATTRACT
CRIMINAL PENALTIES AND LIABILITY FOR DAMAGES AND LEGAL COSTS.


Intouch House, Riverside Drive, Crockhamton,
West Yorkshire, BD19 4DN, United Kingdom
Tel: +44 (0) 127 484 8000
www.matthewsbrandsolutions.co.uk

Elanco™ AF0460

CN: 572517.8

Apralan® 100 g/Kg Premezcla medicamentosa Apramicina

TM

25 kg

PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PIENSOS

Composición cualitativa y cuantitativa de la sustancia activa y otras sustancias:

Cada g contiene:
Sustancia activa: Apramicina (sulfato) 100 mg
Excipientes: Salvado de soja

Especies de destino e indicaciones de uso:

Porcino: Tratamiento de enteritis bacterianas causadas por *Escherichia coli* sensible a apramicina.
Conejos: Tratamiento de la enterocolitis epizoótica.

Posología para cada especie, modo y vía de administración:

Vía de administración: Oral, mezclado en el pienso.

Porcino:

Dosis: 10-20 mg de apramicina/kg p.v./día, durante 21 días consecutivos, administrado en el pienso a la concentración de 1 kg de Apralan 100 g/kg premezcla por tonelada de pienso final.

Conejos:

Dosis: 10-20 mg de apramicina/kg p.v./día, durante 21 días consecutivos, administrado en el pienso a la concentración de 100-200 mg de apramicina/kg pienso (equivalente a 1-2 kg de Apralan 100 g/Kg premezcla/Tm pienso).

Debido a la forma de administración y a que el consumo de pienso depende de la condición clínica del animal, para asegurarse una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario de pienso.

Se recomienda la fórmula siguiente de incorporación de la premezcla en el pienso, en función del peso medio de los animales, el consumo real de pienso (registrado en los días inmediatamente anteriores) y la dosis (en mg/kg p.v.):

$$g \text{ de medicamento/Kg de pienso} = \frac{\text{Dosis de sustancia activa (mg/kg p.v./día)} \times \text{peso medio de los animales (kg)}}{100 \text{ (mg de sustancia activa/g de medicamento)} \times \text{consumo medio pienso (Kg/día)}}$$

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

Recomendación para una correcta administración:

Para favorecer una mezcla homogénea, mezclar con 20-25 kg de pienso antes de incorporarlo al pienso final.

El uso del medicamento debe basarse en la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

El uso inapropiado de los medicamentos veterinarios que contienen antimicrobianos como sustancias activas puede incrementar la aparición de resistencias bacterianas.

Contraindicaciones:

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la apramicina y/o alguno de los excipientes. No usar en gatos.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No administrar con otros aminoglicósidos por su potencial nefrotóxico.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad):

No se han descrito. Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en esta etiqueta, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

Advertencias especiales:

Las personas con hipersensibilidad conocida a la apramicina deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

Puede causar irritación o sensibilización después de contacto con la piel.

Evitar el contacto con la piel y mucosas, así como la inhalación del polvo.

Usar un equipo de protección personal consistente en guantes y mascarilla al manipular el medicamento veterinario.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón.

Uso durante la gestación o la lactancia:

En conejos, dosis orales de apramicina administradas desde el 6° al 18° día de gestación (incluyendo dosis inferiores a las terapéuticas), han demostrado efectos fetotóxicos. La administración a conejas en gestación está contraindicada.

No se ha estudiado la seguridad del medicamento veterinario en cerdas. Su uso no está recomendado durante la gestación y la lactancia en cerdas.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos) en caso necesario:

Porcino: No se han observado efectos adversos a dosis de hasta nueve veces la dosis recomendada.

Conejos: En estudios de toxicidad aguda no se observó mortalidad a la dosis de 832 mg de apramicina/kg p.v.

Precauciones especiales de conservación:

Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Proteger de la luz.

Periodo de validez después de su incorporación al pienso: 3 meses.

Periodo de validez después de abierto el envase primario: Uso inmediato.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario cómo debe deshacerse de los medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Tiempo de espera:

Porcino: Cero días.

Conejos: Cero días.

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Nombre o razón social y domicilio o sede social del titular de la autorización de comercialización y del fabricante responsable de la liberación de los lotes, en caso de que sean diferentes:

Titular de la autorización de comercialización:

Elanco Valquímica, S.A.
 Avda. de la Industria, 30
 28108 Alcobendas (Madrid)

Fabricante que libera el lote:

Eli Lilly and Company Ltd
 Speke operations
 Fleming Road
 Speke, Liverpool L24 9LN (Reino Unido)

Número de registro: 617 ESP

Elanco, Apralan y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de o licenciadas a Eli Lilly and Company o sus filiales.



YL086051SPX (V03-04-2012)

Lot:

Cad:

Shaded Areas = No Text
 60mm Clear from Base of Label = Overprint Area