

GANAMIX COLISTINA 4% PREMEZCLA

COMPOSICION:

Colistina sulfato 1.194.800.000 UI
Excipiente c.s.p.....1.000 g

INDICACIONES:

Conejos: Colibacilosis y Salmonelosis
Porcino y gallinas: Colibacilosis

ESPECIES DE DESTINO:

Porcino, gallinas y conejos.

DOSIS, MODO Y VIA DE ADMINISTRACION:

Vía oral, administración en el alimento

- **Porcino:**

100 –250 ppm durante 7 días

Basándose en este intervalo de dosis, 100 – 250 ppm, en el peso vivo de los animales, en el consumo de pienso diario y en su estado sanitario, el veterinario decidirá el nivel de inclusión de Ganamix Colistina 4 % Premezcla en el pienso.

Para cerdos, la cantidad del medicamento a añadir al pienso (Kg de premezcla/Tm de pienso) puede ser calculada con la siguiente tabla en relación a los consumos de pienso:

Ingesta diaria de pienso en % peso vivo	Cantidad de medicamento a incorporar por tonelada de pienso (ppm)
2%	6,25 Kg premezcla/Tm
3%	4,16 Kg premezcla/Tm
4%	3,12 Kg premezcla/Tm
5%	2,50 Kg premezcla/Tm

- **Gallinas:**

80 -100 ppm durante 5 - 7 días,(equivalente a 2 - 2,5 kg de GANAMIX, COLISTINA 4% PREMEZCLA /Tonelada pienso).

- **Conejos:**

60 - 80 ppm durante 5 - 7 días,(equivalente a 1,5 - 2 kg de GANAMIX, COLISTINA 4% PREMEZCLA /Tonelada pienso).

En los casos que no se alcanza la concentración de 2 kg por tonelada de pienso, tomar la cantidad adecuada de GANAMIX, COLISTINA 4% PREMEZCLA y mezclarlo con 5 kg de pienso durante 5-7 minutos de acuerdo a las instalaciones de la fábrica. A continuación introducir dicha mezcla en la mezcladora general y mezclar entre 2 y 6 minutos, según las instalaciones.

Se aconseja utilizar como excipientes los siguientes productos: Harina de maíz, gluten feed, gluten meal, solubles de destilería, pulpa de remolacha seca,

harina de pescado, harina de carne de huesos, harina de linaza, harina de soja, ya que la densidad respectivamente es 63 - 48,4 - 61,3 - 37 - 41 - 51,7 - 61,3 - 56,5 - 61,3 kg / 100 litros. Todos ellos tienen una granulometría \leq 900 micras.

CONTRAINDICACIONES:

No administrar a animales con insuficiencia renal.

No usar en caso de hipersensibilidad a los antibióticos polipéptidos o a alguno de sus excipientes.

REACCIONES ADVERSAS:

No se han descrito reacciones adversas relacionadas con el uso de sulfato de sulfato colistina por vía oral y a la dosis recomendada en las especies de destino.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Su acción es inhibida por cationes bivalentes como el Ca^{2+} y Mg^{2+} , ácidos grasos insaturados y los compuestos de amonio cuaternario. No se han descrito antagonismos con otros antibióticos cuando se administra por vía oral.

SOBREDOSIFICACION:

En caso de sobredosificación aparecen problemas digestivos transitorios como reblandecimiento de heces y timpanismo.

Pueden aparecer signos de neurotoxicidad y nefrotoxicidad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN:

Siempre que sea posible, el uso de medicamento debe basarse en pruebas de sensibilidad antimicrobiana.

Mezclar bien con el pienso para asegurar una distribución homogénea.

Si no se observa mejoría en 3 días, suspender el tratamiento y revisar el diagnóstico.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO:

No administrar en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO.

Evitar el contacto con la piel y mucosas. Usar guantes, gafas y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla ya que se han descrito reacciones alérgicas a nivel pulmonar.

TIEMPO DE ESPERA:

Carne: Gallinas y conejos: 7 días.

Porcino: cero días

No usar en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano

Conservar en lugar fresco, seco, y al abrigo de la luz

Validez en pienso: 12 semanas

Mantener fuera del alcance de los niños
"Para ser incluida en piensos medicados previa receta veterinaria"
Uso veterinario
Producto original de; Meiji Pharma
Reg. nº 0991-ESP

Lote:

Envase de 25 Kg

Cad.:

Titular y Fabricante

LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/. Barcelonès, 26 (Plà del Ramassà)
Les Franqueses del Valles (Barcelona)

Representante:

INDUKERN, S.A.
Parc Empresarial Mas Blau II
Alta Ribagorza, 6-8
El Prat de Llobregat (Barcelona)